



انواع درد قفسه سینه

انفارکتوس قلبی: ماهیت درد: احساس گرفتگی و فشار، درد همراه با سوزش احتمالا با کوتاهی تنفس، دیافورزیس (تعریق بیش از حد)، ضعف، اضطراب، تهوع همراه می شود. شروع ناگهانی دارد. ۳۰ دقیقه تا دو ساعت طول می کشد. محل درد: به طور تیپیک در امتداد قفسه سینه وجود دارد اما ممکن است به فک، گردن، بازوان یا پشت انتشار یابد. عوامل بهتر شدن درد: مسکن های اپیوئیدی نظیر مورفین و نیز نیتروگلیسرین. عوامل بدتر شدن درد: اضطراب، تقلا	آنژین پکتوریس: ماهیت درد: درد مداوم، فشارنده درد همراه با سوزش. احساس فشار و سنگینی معمولا در عرض ۱۰ دقیقه فروکش می کند. محل درد: زیر استرنوم. ممکن است به فک، گردن، بازوان یا پشت انتشار یابد. عوامل بهتر شدن درد: استراحت، نیتروگلیسرین نکته: آنژین ناپایدار حتی در زمان استراحت نیز پدید می آید و به نیترو جواب نمی دهد. عوامل بدتر شدن درد: خوردن، فعالیت جسمی، استعمال دخانیات، هوای سرد، استرس، عصبانیت، گرسنگی، دراز کشیدن
آنوریسم دیسکان آئورت: ماهیت درد: درد غیر قابل تحمل و شکافنده، ممکن است با اختلاف میان فشارخون ما بین دو دست راست و چپ همراه شود. شروع ناگهانی دارد. محل درد: رتروواسترنال، قسمت فوقانی شکم یا اپی گاستر، ممکن است به پشت، گردن یا شانه ها انتشار یابد. عوامل بهتر شدن درد: مسکن ها، جراحی عوامل بدتر شدن درد: قابل تعیین نیست.	پریکاردیت: ماهیت درد: درد تیز و مداوم، ممکن است با فریکشن راب همراه شود. شروع ناگهانی دارد. محل درد: ساب استرنال، ممکن است به سمت گردن یا بازوی چپ انتشار یابد. عوامل بهتر شدن درد: نشستن، خم شدن به جلو، داروهای ضد التهاب عوامل بدتر شدن درد: تنفس عمیق، وضعیت خوابیده به پشت
پنوموتوراکس: ماهیت درد: ناگهانی، درد شدید، ممکن است با دیس پنه، افزایش تعداد نبض، کاهش صداهای تنفسی یا انحراف تراشه همراه شود. محل درد: قسمت لترال قفسه ی سینه عوامل بهتر شدن درد: مسکن ها، گذاشتن چست تیوب عوامل بدتر شدن درد: تنفس طبیعی	آمبولی ریوی: ماهیت درد: ناگهانی، درد چاقو مانند، احتمالا با سیانوز، دیس پنه، سرفه و هموپتزی همراه می شود. محل درد: بر روی مناطق ریوی عوامل بهتر شدن درد: مسکن ها عوامل بدتر شدن درد: دم

تهیه کننده: سرکار خانم عاطفه دهنو علیان کارشناس ارشد پرستاری