[illegible]

[illegible]

[illegible]

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

تغییرات هیجانی شدید، گریه کردن، خندیدن شدید، استرس، مصرف غذا های آماده(فست فود) عدم تغذیه با شیر مادر چاقی و کم تحرکی، کمبود ویتامین D ، آلودگی هوادر اثر دود اگزوز و کارخانجات برخی داروها همچون برخی از مسکن‌ها(آسپرین، ایبوروفن، مفنامیک‌اسید و حتی برخی از قطره‌های دارویی چشمی) وزن کم موقع تولد و سن کم مادر، زایمان سزارین، مصرف زیاد آنتی‌بیوتیک‌ها بخصوص در سال‌های اول زندگی، تماس مادر در دوران بارداری با دود سیگار در بروز و تشدید این بیماری موثر است .

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد : طبق آخرین مطالعه انجام شده در کشور ما، شیوع علائم آسم در جمعیت کودکان و نوجوانان حدود 11% و در بزرگسالان حدود 9% می باشد. و در حال حاضر بیش از دو هزار نفر در نیشابور مبتلا به آسم شناسایی شده است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور در ادامه افزود : با توجه به شیوع روز افزون این بیماری و عوامل خطر مرتبط با آن و نیز ضرورت پیشگیری و کنترل این بیماری، یکی از مهم ترین اقداماتی که در این زمینه می توان انجام داد، افزایش آگاهی آحاد جامعه نسبت به این بیماری است . بر همین اساس و با توجه به ضرورت پیشگیری و کنترل این بیماری، اولین سه‌شنبه ماه می به عنوان روز جهانی آسم انتخاب شده است. امسال روز جهانی آسم ، مصادف با 13 اردیبهشت 1401 و با شعار «رفع کاستی ها در مراقبت از بیماران مبتلا به آسم » می باشد.

دستجردی در پایان اشاره کرد : در کشور ما نیز این پویش به منظور افزایش آگاهی در خصوص بیماری آسم و عوامل خطر آن، جلب مشارکت ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی و همکاری برای

2 / 3

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

پیشگیری و کنترل این بیماری برگزار می‌شود .

3 / 3

Phoca PDF