دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

بسیاری از داروها می توانند تنظیم قند خون را به هم بزنند و یا با داروهای مورد استفاده در دیابت تداخل داشته باشند. همچنین عوارض خاص دیابت مانند نفروپاتی (آسیب کلیوی) و نوروپاتی (آسیب عصبی) نیز ممکن است نیاز به درمان دارویی داشته باشند.

بعضی از داروها می توانند سبب افزایش قند خون و یا ابتلا به دیابت شوند مانند: کورتون ها، قرص های جلوگیری از بارداری، داروهای ضد جنون، بعضی از داروهای ضد ایدز، آنتی بیوتیک گتی فلوکساسین، پروپرانولول. بعضی از داروها نیز با آسیب به سلول های ترشح کننده انسولین سبب ایجاد دیابت می شوند مانند: پنتامیدین و سیکلوسپورین.

یکسری از داروها نیازمند ملاحظات خاصی در افراد مبتلا به دیابت و عوارض ناشی از آن هستند. مثلا داروی متفورمین و گلی بن کلامید که از طریق کلیه از بدن حذف می شوند، در افراد مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی منع مصرف دارند و هم چنین نباید بطور همزمان با داروهای دارای عارضه کلیوی استفاده شوند.

بنابراین تجویز منطقی دارو کار دشواری است که نیاز به

1 / 3

Phoca PDF

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Phoca PDF