[illegible]

[illegible]

[illegible]

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

این راستا هر سال چک حشره شناسی توسط کارشناس حشره شناسی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها پس از شناسایی مناطق پر خطر همزمان در شهرستان های نیشابور، زبرخان و فیروزه انجام می شود .

هدیه شیرازی نیا تصریح کرد : در سال جدید 13 کانون بیماری سالک (7 کانون در منطقه شهری و 6کانون در منطقه روستای ) شناسایی شد و پس از 7 ماه تله گذاری و چک حشره شناسی در کانون های سالک حدود 30 درصد نمونه های صید شده پشه از نوع فلبتوموس پاپاتاسی می باشد که بالقوه می تواند ناقل بیماری سالک باشد که بیشترین صید از منطقه روستایی صورت گرفت ودر نمونه های شناسایی شده از نوع فلبتوموس پاپاسی 40 درصد مربوط به منطقه شهری و 60 درصد منطقه روستایی می باشد .

وی در پایان در تکمیل نتایج چک حشره شناسایی خاطر نشان کرد : این گونه پشه انتشار وسیعي در ایران دارد و در اکثر نقاط انتشارش اهلي است . فلبوتوموس پاپاتاسي نسبت به سایر گونه ها در اماکن انساني غالب است و حتي در نقاط کوهستاني هم در اماکن انساني یافت مي شود . استراحتگاه آن اماکن حیواني و انساني است و از نقاط دشت خیلي بیشتر از کوهستان صید میشود . از لانة جوندگان، اتاق، اصطبل و شکاف دیوار. به حرارت و رطوبت علاقه دارد و در جایي که سطح آب زیرزمیني بالاست، خوب رشد مي کند . این گونة به حرارت حساس بوده، ولي نسبت به ریزش باران مقاوم است از نظر خونخواري به خون انسان و جوندگان علاقة بیشتري دارد و در موقع تغذیه چندین بار گزش مي کند تا غذاي خود را تکمیل نماید و ارتقای اگاهی کلیه افراد جامعه (کادر بهداشت و درمان، عموم مردم ) و رعایت برخی اصول بهداشت محیط از جمله نصب توری کمک شایانی به پیشگیری و کنترل بیماری سالک می نماید .

2 / 2

Phoca PDF