[illegible] (VIII) [illegible] A: [illegible] [illegible] [illegible]

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

نوع A شایع‌تر از نوع B است.
البته یک نوع نادرتر C هم وجود دارد که کمبود فاکتور ۱۱ است.

هموفیلی یک بیماری ژنتیکی است که به صورت ارثی از مادر به پسر منتقل می‌شود. گاهی اوقات، فرد بدون سابقه خانوادگی نیز به دلیل جهش ژنتیکی جدید به بیماری مبتلا می‌شود.

علائم بالینی هموفیلی معمولا به صورت خونریزی زیاد و طولانی‌مدت پس از بریدگی یا جراحی می باشد. خونریزی‌های بدون دلیل مشخص، به‌ویژه در کودکان هنگام بازی و خونریزی در داخل مفاصل که با درد، تورم و کاهش حرکت مفصل همراه است (شایع‌ترین علامت در افراد مبتلا) از دیگر علایم هموفیلی هستند. گاهی ممکن است خون در ادرار یا مدفوع دیده شود و همینطور کبودی‌های بزرگ و زیاد روی پوست نیز دیده می شود.

در موارد شدید، خونریزی در مغز (نادر اما خطرناک) که می‌تواند با علائمی مثل سردرد، استفراغ و بی‌هوشی همراه باشد از علایم مرگبار بیماری است.

تشخیص هموفیلی معمولاً با انجام آزمایش‌های خون انجام می‌شود. در این آزمایش‌ها سطح فاکتورهای انعقادی در خون بررسی می‌شود. اگر سطح فاکتور ۸ یا ۹ پایین باشد، نوع بیماری مشخص می‌شود.
در خانواده‌هایی که سابقه هموفیلی دارند، آزمایش ژنتیکی نیز می‌تواند قبل از تولد انجام شود.

درمان اصلی هموفیلی، تزریق فاکتورهای انعقادی مصنوعی به بدن است تا خون بتواند لخته شود. این درمان به دو صورت انجام می‌شود:

2 / 4

Phoca PDF

[illegible]

- [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Phoca PDF