دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مطالعات متعدد نشان داده است که افرادی که یک بار به بیماری کرونا (کووید 19) مبتلا شده و در حال حاضر نشانه های بهبودی را بروز داده اند با توجه به احتمال جهش های ژنتیکی ویروس، نهفتگی عامل بیماری در بدن افراد مبتلا و از سویی مصرف خودسرانه داروهای سرکوبگر شانس بروز مجدد علائم بالینی و ابتلا مجدد به بیماری را خواهند داشت . از دلایل این رخداد می توان به تضعیف سیستم ایمنی فرد و احتمال فعال شدن ویروس ضعیف شده در بدن افراد بهبود یافته، ایمنی کوتاه مدت بیماری کرونا در کودکان بهبود یافته و خطای تست های تشخیصی اشاره نمود.

آنچه که انتظار می رود آن است که اگر فردی به بیماری کرونا مبتلا شده و بهبودی کامل رخ دهد، احتمال ابتلا مجدد برای وی در این دوره دور از انتظار است، اما باید اشاره نمود که اگر در دوره های بعدی جهشی در ویروس رخ دهد احتمال ابتلای مجدد بهبود یافتگان به نوع جهش یافته ویروس وجود خواهد داشت.

رعایت نکات زیر برای افراد بهبود یافته همانند سایر افراد به طور جدی ضروری است:

1. طی دو هفته قرنطینه در منزل پس از بهبودی و یا ترخیص از مراکز درمانی

2. حفظ رفتار های بهداشتی،از جمله استفاده از ماسک، شستشوی مرتب دست ها و فاصله گزاری اجتماعی تا پایان دوره شیوع بیماری

منبع :

Batisse, Dominique et al. “Clinical recurrences of COVID-19 symptoms after

1 / 2

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

recovery: viral relapse, reinfection or inflammatory rebound?” The Journal of infection, S0163-4453(20)30454-0.30Jun.2020, doi:10.1016/j.jinf.2020.06.073.

Loconsole, Daniela et al. “Recurrence of COVID-19 after recovery: a case report from Italy.” Infection, 1–3. 16 May. 2020, doi: 10.1007/s15010-020-01444-1

دکتر سید مجید وفایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 / 2

Phoca PDF