دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیشابور از آغاز غربالگری مرحله ی سوم بیماری کووید **-19** در مراکز خدمات جامع سلامت این شهر خبر داد .

فرامرز شیرازی با اشاره به اهمیت تاثیر غربالگری افراد در کاهش بیماری کووید -19 خاطرنشان کرد : درمرحله اول غربالگری بیماری کووید -19 که ازابتدای اسفند ماه 1398 تا هجدهم فروردین سال جاری به طول انجامید، تعداد 486 هزارو 853 نفر به همّت همکاران بهورز و مراقب سلامت، حدود نودوپنج و نیم درصد جمعیت شهرمان از نظر کووید 19 غربال شدند که از این تعداد با تشخیص پزشک تقریبا 61 درصد فاقد مشکل، 34 درصد نیازمند مراقبت در منزل، 0.13 درصد نیازمند شروع درمان تک دارویی و 4.87 درصد هم نیازمند ارجاع به بیمارستان های منتخب بودند .

این مقام مسئول مرحله دوم غربالگری کووید 19 را از تاریخ 99/01/19 تا 99/05/10 اعلام و تصریح کرد : در این مرحله نیز تعداد 327 هزارو 174 نفر (معادل هشتادوچهار درصد جمعیت) غربالگری شدند که در تشخیص پزشک از این افراد حدود 62 درصد نیاز به درخواست آزمایش، 13 درصد نیازمند مراقب در نقاهتگاه و 15 درصد نیاز به رژیم تک دارویی نیاز داشتند همچنین 10 درصد هم ارجاع به بیمارستان منتخب شدند .

شیرازی با اشاره به شرایط فعلی و شیوع بیماری در مناطق مختلف کشور از جمله نیشابور، خاطرنشان کرد : به زودی در مراکز خدمات جامع سلامت،

1 / 2

Phoca PDF

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

غربالگری درمرحله ی سوم نیز اجرایی خواهد شد .

وی در پایان از مردم خواست با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن دست ها به کاهش شیوع بیماری کمک کنند.

2 / 2

Phoca PDF