دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت
بهداشت از ادغام نوبت دوم واکسن تزریقی فلج اطفال در
برنامه کشوری ایمن سازی خبر داد.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد به وب دا گفت: فلج اطفال عفونت ویروسی به شدت مسری است که عمدتا در کشور هایی با آب و هوای معتدل رخ می دهد. عامل این بیماری ویروس پولیومیلیت است که به سه شکل شناخته شده است و در جمعیت غیر واکسینه تقریبیا هر فردی را آلوده می کند. بیشترین عارضه عصبی شناخته شده از این ویروس تیپ 1 آن است.

وی خاطر نشان کرد: در غیاب برنامه های کنترلی موثر با استفاده از واکسن، به طور کلی از هر 200 مورد مواجهه با ویروس یک مورد منجر به بیماری فلج شده که در اکثر موارد سبب ناتوانی دائمی شده و 5 تا 10 درصد موارد فلجی منجر به فوت می شود.

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد ادامه داد: هشتم شهریور ماه

1 / 2

Phoca PDF

[illegible] 1394
[illegible] 4 [illegible]
[illegible] 6 [illegible]
[illegible] 99/10/01 [illegible]
[illegible].

[illegible]:
[illegible].

Phoca PDF