دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور



مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از برگزاری دومین کمیته طبقه بندی موارد مشکوک به فلج شل حاد در معاونت بهداشت خبر داد .

مهندس غلامحسین نوروزی نژاد گفت: بیماری فلج اطفال عفونت ویروسی و به شدت مسری که عمدتا در کشور های با آب و هوای معتدل رخ می دهد و افراد زیر 15 سال که بدون سابقه تروما و ضربه دچار فلج ناگهانی اندام می شوند بایستی مورد بررسی قرار گیرند . بدین منظور دومین کمیته طبقه بندی موارد مشکوک به فلج شل گزارش شده با حضور اعضای کمیته (متخصص عفونی، متخصص اطفال، پزشک اپیدمیولوژی و کارشناس برنامه واکسیناسیون ) در معاونت بهداشت برگزار گردید .

وی در ادامه گفت: با توجه به انجام واکسیانسیون کودکان از سال 1363 و دادن قطره خوراکی فلج اطفال و شروع تزریق واکسن فلج اطفال تزریقی از شهریور ماه 1394 موفق به مهار این بیماری در کشورمان شده ایم و آخرین مورد فلج اطفال در آذر ماه 79 در ایران مشاهده شد و تا کنون ایران

1 / 2

Phoca PDF

[illegible] 99/4/15 [illegible].

[illegible]:[illegible].

[illegible].





Phoca PDF